


NCGM COVID-19 治療フローチャート (成人)

2021年5月10日 第3版作成



* 10,000 単位/日で投与開始。APTT は延長させなくてもいい。基本は経静脈投与だが酸素量 5L/分未満なら皮下注でも可。

| 薬剤名 | 投与量 | 投与期間 | 使用注意 | その他 |
|---------------------|---|------------------------|--|---|
| レムデシビル (ベクルリー®) | 初回 200mg 1日1回 翌日以降 100mg 1日1回 | 5~10日間 | ① eGFR<30mL/min ② ALTが正常上限の5倍以上 | 5日間で臨床症状の改善を認めなければ10日間まで投与延長可 |
| デキサメタゾン | 経口・経管 デカドロン錠®4mg 1.5錠 1日1回 経静脈 デキサート注射液®6.6mg 1筒 1日1回 | 7~10日間 (酸素需要が消失したら終了可) | ① 活動性消化管出血 ② 本薬剤にアレルギーあり | 40kg未満では0.15mg/kg/日に減量。妊婦・授乳婦にはプレドニゾロン 40mg/日で代用。デキサメタゾン以外にも、プレドニゾロンやメチルプレドニゾロン、パルス療法も行われている。 |
| トシリズマブ (アクテムラ®) | 8mg/kg (上限 800mg) を静注 1日1回 ※本薬剤は適応外使用につき各施設内で手続きが必要である | 1日間 | ① 活動性肺結核の可能性がある ② ALTが正常上限の5倍以上 ③ 好中球数<500/mm ³ | 投与前に結核、非結核性抗酸菌症、B型肝炎のスクリーニングを実施 (胸部画像検査、QFT/T-SPOT、HBs抗原・HBs抗体・HBc抗体) |
| バリシチニブ (オルミエント®) | 4mg を1日1回内服 30≤eGFR<60の場合は2mgに減量 | 最大14日間 | ④ リンパ球数<500/mm ³ ⑤ 血小板数<5万/mm ³ | |